

โรคพิษสุนัขบ้า

อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็โรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะที่ ๑

มีไข้ เบื่ออาหาร



ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท กลืนคั้ง



ระยะที่ ๓

ภาวะหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น โคม่า และเสียชีวิต



๓ ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ

พาสต์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อดูวัคซีนป้องกัน



กองสาธารณสุขป้องกัน

กองสาธารณสุขป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่มเสี่ยง

อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี
แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ
ข่วน เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย
กลัวลม กลืนลำบากกลัวน้ำ
คันรุนแรง บริเวณที่เคยถูกกัด อัมพาตตาย

ตัวอย่างโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก	ระยะตื่นเต้น	ระยะอัมพาต
• อิศนเปลี่ยน ไม่รู้เรื่อง	• กระวนกระวาย	• ปากายกิด
• หงุดหงิด เป็นตัว	• กัดไม่เลือก	• ขาดสติ
• ความรุนแรง บานตามากขึ้น	• หัวเขน	• สิ้นใจ ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีส์ไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เสี่ยงถูกด้วยนม เช่น
สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหนะนำโรค

ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%

คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย

ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง

ใส่ยา เบตาดีน

กักหมา - แมว
เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน

หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง
มาตามนัดทุกครั้ง

*****คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง*****

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง

ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง

ทำหมัน คุมกำเนิด

อย่าแหย่	อย่าเหยียบ	อย่าแยก	อย่าหยิบ	อย่ายุ่ง
 คาถา ๕ ย กันสุนัขกัด	 ทำให้อุบัติภัย	 ให้สุนัขตกใจ	 สุนัขที่กัดกันด้วยมือ	 อาหารที่สุนัขกำลังกิน
				 กับสุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ

กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น